

24 órás vizeletgyűjtés VMA, HVA, 5-HIAA vizsgálatához

A gyűjtés kezdetének napján a reggeli első vizeletet kérjük a WC-be üríteni.

Ettől kezdve másnap reggelig egy legalább 2,5 l űrtartalmú, sötétszínű, vagy alufóliázott edénybe a vizeletet szíveskedjen összegyűjteni. A gyűjtés előtt 10 ml stabilizáló tartósítót 0,1%-os sósavat kell az edénybe tenni. a sósavat a Laboratóriumból (Kapás u. 22. I. emelet) tudja beszerezni.

Székelés előtt is ebbe az edénybe kérjük a vizeletet üríteni, hogy ne legyen veszteség.

Másnap reggel az első vizeletet is szíveskedjen az edénybe beleengedni, majd lemérni az egész napi mennyiséget. Keverje össze és ebből 1 dl-t hozzon vizsgálatra. A mért mennyiséget jegyezze fel pontosan.

Keverje össze a gyűjtött mennyiséget, és ebből csak 1dl-t hozzon vizsgálatra sötét üvegben, mert a mintát sötét üvegben kell tárolni.

24 órás vizeletgyűjtés módja

A gyűjtés kezdetének napján a reggeli első vizeletet kérjük a WC-be üríteni.

Ettől kezdve másnap reggelig egy legalább 2,5 l űrtartalmú edénybe szíveskedjen a vizeletet összegyűjteni.

Székelés előtt is ebbe az edénybe ürítse vizeletét, hogy ne legyen veszteség.

Másnap reggel az első vizeletét is engedje bele az edénybe, majd mérje le az egész napi mennyiséget. Keverje össze és ebből 1 dl-t hozzon vizsgálatra, a mért mennyiséget kérjük jegyezze fel pontosan.

Előkészítés C13-Urea kilégzési teszt vizsgálatra

A vizsgálatra kérjük jöjjön ÉHGYOMORral. Kérjük ne egyen, ne dohányozzon, ne rágózzon! Csak szénsavmentes vizet fogyasszon.

Antibiotikum szedése után 6 hétig nem végezhető el a vizsgálat.

2 héten belül nem szedhető proton-pumpa-gátló gyógyszer.

1 nappal a vizsgálat előtt H₂-receptor blokkolót, bevonó szereket, prokinetikumokat már nem szedjen.

Kérjük hozzon magával 2 dl alma- vagy narancs levét!

A vizsgálat 30 percet vesz igénybe.

Előkészítés *hasi ultrahang* vizsgálatához

A vizsgálat éhgyomorral, telt hólyaggal történik.

A vizsgálat előtt 6 órával nem szabad enni, azonban a szokásos gyógyszereit kérjük vegye be vízzel! A vizsgálat előtt 2 órával kb. 4-5 dl csapvíz vagy szénsavmentes ásványvíz elfogyasztása javasolt. Ugyancsak a vizsgálat előtt 2 órával ürítse ki a hólyagját, ezt követően a vizsgálatig tartsa vissza a vizeletét.

Előző vizsgálati eredményét kérjük hozza magával!

Akár délelőtt, akár délután érkezik hasi UH vizsgálatra, javasoljuk gázcsökkentő készítmény bevitelét, mert a vizsgálatok érzékelhetőségét sokszor a bélgázok nehezítik.

Gázcsökkentő készítmény recept nélkül kapható a gyógyszerertárban. Kérje gyógyszerész javaslatát!

Betegtájékoztató vércukor terhelés elvégzéséhez:

- 1./ A vizsgálatához 75 g cukor bevitele szükséges, amelyet gyógyszerárban lehet beszerezni.
A cukor feloldása és bevitele a Laboratóriumban történik.
- 2./ A vizsgálatot éhomi állapotban kell elvégezni, a Laboratóriumban történő vérvételt megelőzően 12 órával már nem szabad enni; folyadékbevitel (víz fogyasztása) lehetséges és szükséges a megfelelő keringés biztosításához.
- 3./ A vizsgálatot megelőző 3 napon kerülni kell a túlzott szénhidrát bevitelt, a megerőltető fizikai aktivitást.
- 4./ A terhelés teljes időtartama alatt a Laboratóriumban kell tartózkodni, enni, dohányozni nem szabad.

Előkészítés röntgen vizsgálatra

A vizsgálatra érkezés előtt még otthonában kérjük vegyen ki minden testékszert – amennyiben ez megoldható-, mivel jelenlétük zavarhatja a vizsgálat menetét vagy a lelet értékelését.

Szemfenék vizsgálat előkészítés

Ha szemfenék vizsgálatra kap beutalót kérjük szíveskedjen időpontot kérni.

Gépjármű nélkül, vagy kísérelővel érkezzen!

A vizsgálat kb. 30 percig tart, melynek során nagy valószínűséggel pupilla tágító cseppet kap. Ez látását homályossá teheti, mely állapot több óráig fennállhat. Ebben nagy egyéni eltérés lehetséges. A fentiekre való tekintettel javasoljuk, hogy munkavégzés után jelentkezzen erre a vizsgálatra.

Torok, orr, fülváladék levétele

Tájékoztatjuk, hogy ezen vizsgálatok elvégzésére hétfőn és szerdán reggel 8 és 9 óra között van lehetőség a fül-orr-gégészeti osztályon.

Torokváladék levételére kérjük, hogy éhgyomorral, fogmosás nélkül jelentkezzen.

Reggeli gyógyszereit vegye be!